

Le frelon asiatique

Pourquoi la situation est urgente

Les apiculteurs alsaciens signalent des attaques de leur colonies d'abeilles sur l'ensemble du Bas-Rhin. Ces attaques ont déjà décimé de nombreuses ruches. La lutte contre le frelon asiatique nous concerne tous parce que ce n'est pas que protéger les abeilles c'est aussi protéger l'entomofaune (ensemble des insectes).

Historique de l'invasion

Tout a commencé en 2004, dans le Lot-et-Garonne. Il est arrivé sur le territoire et a commencé une colonisation à raison de 80 km tous les ans pour arriver sur le territoire alsacien d'abord par de brèves incursions depuis 2017, puis de manière importante depuis 2023.



Qui est Vespa Velutina Nigrithorax ?

Le frelon, dit asiatique, fait partie de la famille des guêpes. (Vespidae). Son thorax est très noir, ses pattes sont jaunes. Il est plus petit que le frelon européen.

Un nid de frelons asiatiques consomme sur une année **11 kg** d'insectes (abeilles, abeilles sauvages, guêpes autres, papillons, mouches, araignées = entomofaune). A certaines périodes de l'année, il s'attaque aux produits sucrés, aux fruits des vergers, à la vigne (perte de récolte).

Le nid primaire et le nid secondaire

Le nid primaire du frelon asiatique est toujours dans une zone abritée des intempéries et a une taille d'une orange. En juin, il construit un nid secondaire qui peut se retrouver au sommet des arbres, mais aussi dans des arbustes, des ronces et atteint des tailles de 80 cm de diamètre. Il n'est souvent visible qu'en automne à la tombée des feuilles.



La lutte au printemps

Elle s'organise autour de 2 axes. La recherche des nids primaires et leur neutralisation et le piégeage des fondatrices qui se fait avec des pièges dits **sélectifs** avec des recommandations précises.

Piéger une seule fondatrice c'est empêcher un nouveau nid secondaire.

Les référents frelons des associations apicoles sauront vous renseigner pour organiser cette lutte lors de séances d'information.

**Si vous voyez un nid de frelons asiatiques,
si vous observez un nid primaire,
si vous observez des frelons asiatiques**

**N'intervenez pas vous-même, c'est dangereux
Ne vous en approchez pas à moins de 10 mètres (pour le nid secondaire)**

**Soyez prudent lors des tailles de haies et des travaux d'égavage
Soyez prudent lors des travaux sur ou sous-toitures**

Le frelon asiatique est un insecte piqueur, qui peut piquer plusieurs fois, qui injecte du venin ce qui peut provoquer des **accidents graves** liés aux piqûres. Il a un comportement défensif de son nid et devient très agressif à la moindre approche. Le dard du frelon asiatique fait 4 mm. En cas de piqûres multiples, appeler les secours (15/18/112)

Signalez le nid sur

www.lefrelon.com

ou à **la mairie du lieu d'observation**

ou à **votre association apicole locale**

avec le soutien du Groupe Frelon 67 (referentfa67@gmail.com)

(Fédération des Syndicats des Apiculteurs du Bas-Rhin, le Groupe de Défense Sanitaire Apicole du Bas-Rhin et la Collectivité Européenne d'Alsace)



